

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管しておいてください。

かゆみ止め薬

# hadana

(販売名:キンカンソフトG)

ハダナ かゆみ止め

第2類医薬品

## ■製品の特徴■

ハダナ かゆみ止めは、ほのかな花の香りのかゆみ止め薬です。  
ジフェンヒドラミン塩酸塩の抗ヒスタミン作用、リドカインのかゆみ伝達ブロック作用、  
d-カンフルとl-メントールの患部冷涼作用のトリプル作用でかゆみをすばやくしずめます。

## ⚠️■使用上の注意■

**⊗してはいけないこと**〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。〕

1. 次の部位には使用しないでください。

目の周囲、粘膜等



## ■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 本品を5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能又は効果■

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

## ■用法及び用量■

1日数回、適量を患部に塗布してください。



### <用法・用量に関連する注意>

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)外用にのみ使用してください。

(裏面もお読みください)

## ◆使用方法

- ①ご使用前にボトルを上向きにし、スポンジ中央を数回押してください。  
中の空気が抜け、液の出過ぎを防ぐことができます。(図1)
- ②患部を清潔な状態(汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態)にしてください。
- ③スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませてから塗ってください。(図2)  
※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



## ■成分と働き■ (100mL中)

成分	含量	働き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2 g	かゆみの原因物質であるヒスタミンを抑え、患部のかゆみを抑えます。
リドカイン	1 g	かゆみの伝わりを抑えます。
d-カンフル	1 g	患部に冷涼感を与え、かゆみを抑えます。
l-メントール	3 g	

添加物としてクエン酸水和物、香料、溶剤としてエタノールを含有します。

## ■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)溶剤としてアルコールを含んでいるため、下記事項に充分注意してください。
  - 暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。
  - 車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。
  - プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

## ■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社 金冠堂 お客様相談室 TEL: 03-3421-6171 (代表)

[受付時間: 9:00 ~ 16:00 月~金(祝日を除く)]

製造販売元 株式会社 金冠堂  
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-34-14  
<http://www.kinkan.co.jp>