

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆみ 肩こりに
キンカン[®]
外用鎮痒鎮痛消炎剤

第2類医薬品

■ 製品の特徴 ■

キンカンは有効成分が複合的に作用して、すばやく患部の熱を奪い去り、局所刺激を与えることにより、かゆみや痛みの伝わりを抑制し、虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫に対して優れた効果を発揮します。

 ■ 使用上の注意 ■

 **してはいけないこと** [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

- 次の部位には使用しないでください。
 - 目の周囲、粘膜等
 - かぶれ、傷口
- かぶれる恐れがあるので、ガーゼ等に浸して患部に貼り付けないでください。

 ■ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 湿潤やただれのひどい人
 - 皮膚の特に弱い人や乳幼児
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、ただれ、灼熱感

- 本品を5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能又は効果 ■

虫さされ、かゆみ、肩こり、腰痛、打撲、捻挫

■ 用法及び用量 ■

1日数回、患部に適量を塗布してください。



<用法及び用量に関連する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。誤って口に入った場合には、水でうがいをしてください。飲み込んでしまった場合には、医師に相談してください。

(裏面もお読みください)

◆使用方法

- ①ご使用前に瓶を上向きにし、スポンジ中央を数回押してください。
中の空気が抜け、液の出過ぎを防ぐことができます。(図1)
- ②患部を清潔な状態(汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態)にしてください。
- ③スポンジを患部に軽く押しつけ、液をふくませます。(図2)
- ④「塗ってはよく乾かし」を複数回繰り返してください。
※かぶれる恐れがありますので、完全に液が乾くまでは衣服・ガーゼ等で覆わないようにしてください。
※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



■成分及び分量■ (100mL中)

成分	含量
アンモニア水	21.3mL
<i>l</i> -メントール	1.97g
<i>d</i> -カンフル	2.41g
サリチル酸	0.57g
トウガラシチンキ	0.35mL (原生薬量として35mg)

添加物として朝鮮人参抽出液、溶剤としてエタノールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓し立てて保管してください。
- (3)溶剤としてエタノールを含んでいるため、以下の事項に充分注意してください。
 - 暖房器具等の火気の付近では、破裂、引火等の危険性があるので、近づけないでください。
 - 車の中は、高温になりやすいので、放置しないでください。
 - プラスチック類、化繊製品、皮革製品、家具、床、その他塗装箇所に液が付着すると、変色・変質することがあります。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は以下のお客様相談室までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社金冠堂 お客様相談室 TEL 03-3421-6171(代表)

受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

製造販売元 株式会社金冠堂
〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号