

服用の前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

湿疹・かぶれによるかゆみに

キンカン[®]AL錠

アレルギー用薬

第2類医薬品

キンカンAL錠は、全身のかゆみにご使用いただける内服タイプのアレルギー用薬です。抗ヒスタミン作用をもつジフェンヒドラミン塩酸塩が体内のアレルギー反応を鎮め、じんましん、鼻炎、湿疹・かぶれによるかゆみの症状を抑えます。

⚠ 使用上の注意

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬、乗物酔い薬等）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。（眠気等があらわれることがあります。）
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
4. 服用前後は飲酒しないでください。
5. 長期連用しないでください。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)次の症状のある人。
排尿困難
 - (5)次の診断を受けた人。
緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
泌尿器	排尿困難

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
□のかわき、眠気
4. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(裏面もお読みください)

■効能又は効果■

じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、鼻炎

■用法及び用量■

次の1回量を1日3回、水又は温湯で服用してください。

年 令	1回量
大人(15才以上)	3錠
11才以上15才未満	2錠
5才以上11才未満	1錠
5才未満の幼児	服用しないこと

- 食前・食後にかかわらず、いつでも服用できます。
(服用間隔は4時間以上あけることをお勧めします)

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分及び分量■ (9錠中)

ジフェンヒドラミン塩酸塩 90mg

添加物として、セルロース、乳糖、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)
- (4)水分が錠剤につくと、内容成分の変化のもととなりますので、水滴を落とし、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5)ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気等により、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどビンのキャップをよくしめてください。
- (6)ビンの中の詰め物(ビニール)は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開栓後は捨ててください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は以下のお客様相談室までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社金冠堂 お客様相談室 TEL 03-3421-6171 (代表)

受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

発売元 株式会社金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目34番14号

製造販売元 セントラル製薬株式会社

大阪府中央区北浜東1番29号