

外用鎮痒消炎剤 第②類医薬品

販売名：キンカンPVA EXゲル

容量：20g

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の部位には使用しないでください。(1)水痘(水ぼうそう)、みずむしたむし等又は化膿している患部(2)創傷面、目の周囲、粘膜等
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください。
3. 長期連用しないでください。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人(4)患部が広範囲の人(5)潤滑やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむしたむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん

【用法及び用量】

1日数回、適量を患部に塗布してください。

【消費者相談窓口】

株式会社金冠堂 お客様相談室

TEL 03-3421-6171(代表)

受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

【チューブの穴の開け方】

開封時チューブの先を上向きにし、キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当てて穴を開けてください。

発売元

株式会社金冠堂

〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目34番14号

【用法及び用量に関連する注意】

(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用のみ使用してください。(5)薬剤塗布後、その部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。

【成分及び分量】(100g中)

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)…0.15g、ジフェニヒドラミン塩酸塩…1.00g、クロタミトン…5.00g、グリチルレチン酸…0.30g、サリチル酸グリコール…1.00g、アラントイン…0.20g、インプロピルメチルフェノール…0.10g、ジブチン塩酸塩…0.25g、dl-カンフル…1.00g、l-メントール…3.50g、トコフェロール酢酸エステル…0.50g
添加物としてアジピン酸ジイソプロピル、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル、ヒドロキシプロピルセルロース、疎水性ヒドロキシプロピルメチルセルロース、BHT、乳酸、乳酸ナトリウム液を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)小児の手の届かない所に保管してください。(2)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に密栓し、保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。)(4)火気に近づけないでください。また、使用後は火中に投じないでください。(5)メガネ、時計、アクセサリー、プラスチック類、床や家具等の塗装面、化粧品、皮革製品等にゲルが付着すると変色・変質することがありますので、付着しないように注意してください。(6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

火気厳禁

製造販売元

株式会社 雪の元 本店

奈良県橿原市大谷町182番地

2302-AHI 003A